

OP DE SNIJTAFEL



Long-COVID kenmerkt zich door aanhoudende symptomen na de initiële COVID-infectie. En die kunnen hardnekkig zijn. Ze stellen de zorg voor grote uitdagingen. Een greep uit recente onderzoeksresultaten.

TEKST FRED HERMSEN

10%

Meer dan 10% van de COVID-19 patiënten kampt ermee, waarvan ongeveer 45% specialistische zorg nodig heeft.

15%

Sinds de start van de pandemie zijn de wachttijden voor revalidatiebehandelingen met 15% gestegen.

30%

Meer dan 30% kampt met depressieve gevoelens of angststoornissen.

75%

meldt vermoeidheid, 50% heeft ademhalingsproblemen en 40% kampt met aanhoudende concentratieproblemen.

20-30%

Tot 20-30% van de mensen met long-COVID zou na zes maanden nog steeds niet in staat zijn om volledig te werken.

25%

van de long-COVID patiënten keert een jaar na hun initiële diagnose meerdere keren terug naar het ziekenhuis.

50-70%

Er is 50-70% lagere kans op long-COVID na een doorbraakinfectie als patiënten zijn gevaccineerd.

40-60%

van de deelnemers aan specifieke revalidatieprogramma's of behandelingen krijgen te maken met verbeterde symptomen.

(Bronnen zijn opvraagbaar bij de redactie)

